


Osteonekroza kości szczęk po stosowaniu bisfosfonianów oraz inne zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej u chorych ze szpiczakiem mnogim

Maciej R.Czerniuk

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kraków, 06.09.2010r




Rycina 1

ZWIĄZKI MIĘDZY CH.PZ. A ACS



Opis przypadku

- pacjent lat 62,
- 2001 r: operacja lewego nadgarstka – zespół jego cieśni,
- 2002 r: otwarte, wieloodłamowe złamanie nasady dalszej goleni prawej oraz **kompresyjne złamanie kręgosłupa** w odcinku Th10,
- 2007 r: operacja odbarczenia kanału kręgowego w odc. L3-L4 i L4-L5 z powodu stenozy drogą fenestracji – chromanie neurogenne: brak poprawy,
- 2008 r: pobyt w Klinice Neurologii – diagnostyka sztywności mięśni: **obecność monoklonalnego białka Bence – Jonesa w surow/moczu** oraz **▲ zwiększone stężenie α 2-makroglobuliny** ▶ trepanobiopsja ▶ ogniskowe cechy zwyrodnienia: wakuolizacja i rozpad ▶ podejrzenie MM,
- Klinika Hematologii WUM: 2 x autoprzeszczep szpiku.




Badanie stomatologiczne


- wyczuwalne zmiany na bł. śluzowej jamy ustnej o charakterze przerostu włóknistego: warga górna / dolna, sklepienie / dno przedsionka, symetrycznie okolica kątów ust, twardość +/- ► sklerodermia,
- badanie mikroskopowe: włókna o prawidłowej Ø, nieregularnie przemieszane, cechy zanikowe,
- enzymatyczne różnicowanie włókien: ▲ typ 1. i ▼ typ 2.: ▼ Ø: ► dystrofia miotyczna typu 2. (zmiany niecharakterystyczne).




30.1.2006



SIEMENS ORTHOPEDIC











5
ECaktiv CE
RÖDER GERMANY
STAINLESS

5
ECaktiv CE
RÖDER GERMANY
STAINLESS

























Dziękuję za uwagę...